

تعميم رقم 72
دلائل إرشادية خاصة بوقاية مخالطي حالات التهاب السحايا او الخمج الدموي
الناتج عن Neisseria Meningitidis

رقم المحفوظات: 1/203-1/1
بيروت في : 28 تموز 2003

على الاطباء رؤساء أقسام الصحة في الاقضية ورؤساء مصالح الصحة في المحافظات ، العمل على تأمين الوقاية الكيماوية بالمضادات الحيوية لمخالطي حالات التهاب السحايا او الخمج الدموي الناتج عن Neisseria Meningitidis و ذلك عند حدوث حالات فردية sporadic cases ، و ذلك بهدف الوقاية من الإصابات الثانوية.

تحدد حالات التهابات الناتجة عن Neisseria Meningitidis بما يلي :

الحالة المحتملة Probable :

حالة التهاب السحايا الحاد Meningitis او الخمج الدموي Septicemia

و إحدى النقاط التالية :

*وجود طفح جلدي حبري او فرفري purpuric/petechial rash
*ظهور مكورات مزدوجة سلبية الغرام Gram negative diplococci

الحالة المثبتة Confirmed :

زرع إيجابي للجراثومة في السائل النخاعي او الدم
أو

إيجابية فحص مستضد النيسرية السحائية في السائل النخاعي CSF antigen detection

يُعرف مخالطي حالات التهاب السحايا او الخمج الدموي الناتج عن Neisseria Meningitidis بما يلي :

*المخالطين في المنزل : ذوي المريض الذين يقطنون تحت السقف الواحد
*المخالطين في المدرسة : التلامذة والمعلمون الذين يرتادون صف وباص التلميذ المريض
*المخالطين في دار الحضانة : كافة الأطفال و العاملين في دار الحضانة
*المخالطين في الثكنات العسكرية : كل العناصر الذين يبيتون معه في نفس الغرفة
*المخالطين في المؤسسات الصحية والمستشفيات : فقط من قام باجراء تنفس اصطناعي للمريض وكان له تماس مباشر مع افرازات فم المريض
*كل من له تماس مباشر مع افرازات فم المريض.

يعتمد في وقاية المخالطين إحدى البروتوكولات التالية :

اسم الدواء	جرعة البالغين	جرعة الأطفال	جرعة الرضع دون الشهر	طريقة الإعطاء	المدة
ريفامبيسن Rifampicine	600 mg X2/day	10 mg /kg x2 /day	5 mg /kg x2 /day	PO	يومين
سبيراميسين Spiramycine	1 g X2 /day	25 mg /kg x2 /day	25 mg /kg x2 /day	PO	5 ايام
سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin	500 mg			PO	جرعة واحدة
سيفترياكسون Ceftriaxone	250 mg			IM	جرعة واحدة

يياشر بالوقاية بالمضادات الحيوية لجميع المخالطين في نفس الوقت وفي أسرع وقت ممكن وقيل مضي أسبوعين من تاريخ ظهور الحالة.

يتم تأمين الأدوية اللازمة من خلال مراكز مكافحة التدرن لل Rifampicine ، أو من خلال مستودع الأدوية المركزي للأدوية الأخرى بناء على وصفة طبية و التقرير الطبي مرفق.

يتم مراقبة المخالطين بحثاً عن إصابات ثانوية.

كما يتم توثيق الإجراءات حسب النموذج المرفق وترسل نسخة إلى وحدة الترصد الوبائي في مديرية الوقاية الصحية مع تبيان المخالطين.

مدير عام وزارة الصحة العامة

الدكتور وليد عمار

يبلغ :
مديرية الوقاية الصحية
مديرية مختبرات الصحة العامة
مديرية العناية الطبية
مصلحة الطب الوقائي
وحدة الترصد الوبائي
اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية
مصالح الصحة في المحافظات
أقسام الصحة في الأقسضية
البرنامج الوطني لمكافحة التدرن
المستودع المركزي للأدوية
نقائبي أطباء لبنان و الشمال
الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية
وزارة الدفاع – اللواء الطبي
وزارة الداخلية – مصلحة الصحة
وزارة التربية – وحدة التربية الصحية
منظمة UNRWA
المحفوظات

الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
المديرية العامة

تقرير حول وقاية مخالطي حالات التهاب السحايا او الدم
الناتج عن Neisseria Meningitidis

المريض

اسم المريض	تاريخ الولادة	البلدة	القضاء

المستشفى

اسم المستشفى	اسم الطبيب المعالج	تاريخ دخول المستشفى

طريقة التشخيص

Blood: Neisseria عزل meningitidis	CSF: Neisseria عزل meningitidis	CSF: Soluble Antigenes	Diplococci gram negative	Purpura/petechial rash
ايجابي -	ايجابي -	ايجابي -	ايجابي -	نعم -
سلبي -	سلبي -	سلبي -	سلبي -	كلا -
لم يطلب -	لم يطلب -	لم يطلب -	لم يطلب -	

تحديد مهنة المريض:

المهنة	المؤسسة	العنوان	اسم المدير	رقم الهاتف

تحديد عدد المخالطين:

المجموع	الكبار	الأطفال	المجموع
			المنزل
			دار الحضنة
			المدرسة
			ثكنة عسكرية
			المستشفى
			غيره
			المجموع

تحديد بروتوكول الوقاية :
ظهور حالات ثانوية:

اسم طبيب القضاء	التاريخ	الامضاء

